



Федеральная служба
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека



ЦЕНТР
ГИГИЕНЫ
И ЭПИДЕМИОЛОГИИ
В РЕСПУБЛИКЕ
БАШКОРТОСТАН

Профилактика коклюша и дифтерии



Профилактика коклюша и дифтерии

Коклюш – острое инфекционное заболевание, которое характеризуется длительным течением. Отличительный признак болезни – спазматический кашель.

Механизм передачи инфекции воздушно – капельный. Особенностью коклюша является высокая восприимчивость к нему детей, начиная с первых дней жизни.

С момента контакта с больным коклюшем до появления первых признаков болезни проходит от 3 до 15 дней. **Особенностью коклюша** является постепенное нарастание кашля в течение 2 – 3 недель после его появления.

Типичные признаки коклюша:

- ❖ упорный усиливающийся кашель, постепенно переходящий в приступы спазматического кашля (серия кашлевых толчков, быстро следующая друг за другом на одном выдохе) с судорожным вдохом, сопровождающимся свистящим протяжным звуком. У грудных детей такой кашель может привести к остановке дыхания. Приступы кашля усиливаются ночью и заканчиваются выделением небольшого количества вязкой мокроты, иногда рвотой;
- ❖ одутловатость лица, кровоизлияния в склеры;
- ❖ язвочка на уздечке языка (вследствие её травмирования о края зубов, так как во время приступа кашля язык до предела высовывается наружу, кончик его загибается кверху).

Коклюш нередко осложняется бронхитами, отитом, пневмонией, выпадениями прямой кишки, пупочной и паховой грыжами.

После перенесенного коклюша длительное время (несколько месяцев) могут возвращаться приступы кашля, особенно, если ребенок простудится или при физической нагрузке.

Дифтерия – это острое инфекционное заболевание бактериальной природы, которое передается воздушно-капельным путем, характеризуется образованием серых налетов в месте проникновения возбудителя, чаще на



02.fbuz



vk.com/sesufa

sesufa.ru

слизистых оболочках ротоглотки и дыхательных путей, общей интоксикацией, поражением сердечно-сосудистой, нервной систем и почек.

Источником инфекции является только человек – больной или носитель.

Заболевание начинается с болей в горле, как при ангине, повышается температура до 38-39 °С, появляется слабость, у детей ухудшается аппетит. На выпуклой поверхности миндалин появляются серовато-белые налеты однородной плотной консистенции. В последующие дни состояние становится более тяжелым, появляется отек слизистой оболочки зева и видимый тестообразный отек шеи.

При первых признаках заболевания необходимо вызывать врача на дом. Отделить его от остальных членов семьи, выделить ему отдельную посуду, полотенце. Посуду мыть отдельно горячей водой с мылом. Комнату, где находится больной, желательно проветривать и убирать влажным способом. Госпитализировать больного дифтерией необходимо обязательно для проведения специального лечения, спасения жизни больного и изоляции его от восприимчивых к дифтерии лиц.

Единственным эффективным средством защиты от дифтерии и коклюша в настоящее время является правильно организованная, своевременно и качественно проведенная вакцинопрофилактика.

Для профилактики дифтерии и коклюша применяют - адсорбированную коклюшно-дифтерийно-столбнячную вакцину (АКДС), для проведения 2-й и 3-й возрастных ревакцинаций детей против дифтерии, проведения вакцинации и ревакцинации взрослому населению используется анатоксин дифтерийно- столбнячный.

Согласно Национальному календарю профилактических прививок Российской Федерации первую вакцинацию против дифтерии ребенок получает в 3 месяца, вторую - в 4,5 месяца, третью - в 6 месяцев. Далее он получает ревакцинации в 18 месяцев, в 6 - 7 лет и 14 лет. Взрослым необходимо ревакцинироваться каждые 10 лет с момента последней ревакцинации.



02.fbuz



vk.com/sesufa

sesufa.ru

Центр гигиены и эпидемиологии проводит отбор мазков на выявление следующих возбудителей:

Коклюша	От 1 до 50 человек одновременно	198 Р
	От 50 до 100 человек одновременно	174 Р
	От 100 человек одновременно	132 Р
Дифтерии	От 1 до 50 человек одновременно	198 Р
	От 50 до 100 человек одновременно	174 Р
	От 100 человек одновременно	132 Р

Будьте здоровы!

Федеральное Бюджетное Учреждение Здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»

Контактный телефон 8 (347) 287-85-00



02.fbuz



vk.com/sesufa

sesufa.ru